

DESCRIPTION

Manvert 8-8-6 est un engrais NPK avec des oligo-éléments chelatés pour application foliaire.

CARACTÉRISTIQUES

Manvert 8-8-6 est un engrais pour application foliaire qui contient de l'Azote, du Phosphore, du Potassium avec une relation de 1-1-0.

Il est formulé pour apporter les éléments nécessaires aux cultures, à des moments d'activités intenses où un supplément de ces nutriments est essentiel pour leurs croissances et quand les plantes ne peuvent s'approvisionner uniquement du sol.

Manvert 8-8-6 fournit à la plante tous les macros et micronutriments nécessaires, de manière qu'elle puisse les utilisées tout au long de sa croissance.

Manvert 8-8-6 améliore la croissance de la plante, il augmente sa résistance face aux adversités climatiques et améliore la phase de bourgeonnement. Il permet une croissance homogène et une meilleure qualité de fruit. Il permet l'élimination de la chlorose nutritionnelle, la déformation des fruits, l'alternance de la production, et les effets néfaste des produits antiparasitaires et des parasites.

OBSERVATION

Manvert 8-8-6 peut s'appliquer sur tout type de cultures.

Manvert 8-8-6 est compatible avec la majorité des produits phytosanitaires de la gamme PHYTOGRAINES, excepté ceux à réaction alcaline et les huiles minérales.

COMPOSITION CHIMIQUE

Azote total (N): 8,0% p/p (9,6% p/v)

Azote nitrique (N): 2,5% p/p (3,0% p/v)

Azote ammoniacal (N): 3,1% p/p (3,7% p/v)

Azote uréique (N): 2,4% p/p (2,9% p/v)

Anhydride Phosphorique (P_2O_5) soluble dans l'eau et citrate ammoniacale: 8,0% p/p (9,6% p/v)

Oxyde de Potassium (K_2O) soluble dans l'eau: 6,0% p/p (7,2% p/v)

Cuivre (Cu) chelaté et soluble dans l'eau: 0,005% p/p (0,006% p/v)

Manganèse (Mn) chelaté et soluble dans l'eau: 0,01% p/p (0,01% p/v)

Zinc (Zn) chelaté et soluble dans l'eau: 0,005% p/p (0,006% p/v)

Cuivre, Manganèse et Zinc chelatés avec EDTA.

pH: 5-6. et Chlore <1%.

Contient du Bore et du molybdène.

APPLICATIONS ET RECOMMANDATION D'USAGE

Manvert 8-8-6, s'applique par pulvérisation foliaire. Il faut faire entre 4 et 6 traitements tout les 15 à 20 jours à partir de la nouaison des bourgeons puis pendant toutes les phases de croissance antérieure à la récolte.

Olivier (300-500 cc/hl, 5-7 l/ha)

Fruitier à noyau 250-500 cc/hl, 3-5 l/ha)

Fruitier à pépin (pomme, poire) (250-500 cc/hl, 3-5 l/ha)

Vigne (250-400 cc/hl, 3-5 l/ha)

Agrumes (250-500 cc/hl, 3-5 l/ha)

Fraise (250-500 cc/hl, 2-5 l/ha)

Culture Maraichère (Tomate, concombre et

PHYTOGRAINES CAMEROUN SARL
Une entreprise au service de l'agriculture
Avenue de la République
BP 1353 Bafoussam (Cameroun)
Tel.: (+237) 33 44 35 27
Fax: (+237) 33 44 67 24
E-mail: contact@phytograines-cameroun.com
Internet: http://www.phytograines-cameroun.com

autres) (200-400 cc/hl, 2-4 l/ha)

Florales et ornementales (150-300 cc/hl, 2-4 l/ha)

Cultures Extensives (luzerne et trèfle) (3-6 l/ha par application)

Fertigation 10-12l/ha par jour

NPK's + Oligoéléments